

**PROCEDURA DE DISTRUGERE A VACCINURILOR
DETERIORATE SI/SAU EXPIRATE**

Distrugerea in siguranta a vaccinului/diluantului expirat si/sau deteriorat

Fundamentare

Personalul responsabil cu manipularea vaccinului trebuie sa cunoasca procedura corecta de depozitare, raportare si inlaturare a vaccinului/diluantului expirat si/sau deteriorat.

Obiectiv

Eliminarea in conditii de siguranta a vaccinului/diluantului deteriorate si/sau expirate in perioada de depozitare.

Responsabilitati

1. Medicul de familie, medicul din maternitate, personalul din cadrul Directiilor de Sanatate Publica Judetene/a municipiului Bucuresti desemnat cu manipularea vaccinului are obligatia de a identifica si de a izola vaccinul/diluantul expirat si/sau deteriorat.
2. Medicul de familie/ medicul din maternitate cu ajutorul DSPJ/a municipiului Bucuresti, responsabilul DSPJ/a municipiului Bucuresti cu manipularea vaccinului are obligatia de a inventaria si de a aplica masurile necesare de distrugere.

A. Managmentul vaccinului si diluantului deteriorate si/sau expirat

Vaccinurile in seringi preumplute sau conditionate mono/multidoza se pot deteriora si/sau expira. Vaccinurile liofilizate si diluantii asociati pot sa aiba date de expirare diferite, de aceea este important ca in stoc sa fie facuta usor asocierea intre vaccinuri si diluanti in functie de data expirarii.

Procedura de manipulare a vaccinului/diluantului compromis se va face cu echipament de protectie (manusi) si se vor folosi substante dezinfectante.

A.1 Responsabilitati

a. Directia de Sanatate Publica Judeteană/ a municipiului Bucuresti prin responsabilul Programului National de Vaccinare are urmatoarele obligatii:

- de a tine evidenta stocului vaccinurilor/diluantilor in functie de data expirarii
- de a centraliza lunar stocul de vaccinuri/diluanti atat din depozitul DSP cat si din teritoriu
- de a monitoriza incidentele (expirare, deteriorare vaccin) semnalate de catre medicii de familie/maternitati prin formularul de raportari a pierderilor (anexa 1)
- pierderile vor fi raportate de catre DSP catre INSP-CRSP/ CNSCBT lunar folosindu-se formularul de raportare a utilizarii lunare a vaccinurilor din cadrul Programului National de Vaccinare

- de a solicita suportul tehnic INSP-CRSP si CNSCBT ori de cate ori se confrunta cu o situatie deosebita

b. Medicul de familie/medicul din maternitate are urmatoarele obligatii:

- de a utiliza vaccinul/diluantul tinand cont de termenul de expirare
- de a semnala Directiei de Sanatate Publica Judeteană/ a municipiului Bucuresti faptul ca vaccinul/diluantul se apropie de termenul de expirare (cu cel putin 1 luna inainte de expirare)
- de a anunta imediat Directia de Sanatate Publica Judeteană/ a municipiului Bucuresti orice incident care a dus la deteriorarea unui vaccin/diluent.

A2. Managementul vaccinului/diluantului expirat

- identificarea produselor expirate depozitate in echipamentele frigorifice
- vaccinul expirat care a fost identificat va fi pus intr-un container pe care se va scrie” VACCIN EXPIRAT PENTRU DISTRUGERE-NU FOLOSITI”; containerul astfel etichetat va fi depozitat intr-un echipament frigorific pana cand se va obtine acordul din partea Responsabilului Programului National de Vaccinare din cadrul DSPJ/INSP-CRSP/CNSCBT dupa caz, de a fi indepartat si distrus
- diluantul expirat care a fost identificat va fi pus intr-un container pe care se va scrie” DILUANT EXPIRAT PENTRU DISTRUGERE-NU FOLOSITI”; containerul astfel etichetat va fi depozitat intr-un loc sigur in depozitul de materiale uscate
- inventarul vaccinurilor/diluantilor expirate/i se face folosind formularul de raportare a pierderilor (Anexa 1) care va fi transmis de catre medicii de familie/maternitate la DSP de care apartin; aceste produse vor figura in stocul de vaccin din cadrul cabinetului/maternitatii/ DSP-ului.

A3. Managementul vaccinului/diluantului deteriorat fizic

- flacoanele de vaccin pot suferi deteriorari fizice in mod exceptional deoarece sticla este foarte robusta, dar fiolele de vaccin si de diluanti se pot sparge usor; persoana care a avut sau este implicata in acest incident va utiliza manusi de protectie si va actiona astfel:
 - fiolele/flacoanele sparte si contaminate se pun intr-un container de plastic, peste care se adauga dezinfectant
 - daca vaccinul s-a varsat se curata zona cu dezinfectant, se aduna cu grija cioburile flaconului/fiolei si pun intr-un container etichetat “ VACCIN DETERIORAT PENTRU DISTRUGERE- NU FOLOSITI” si se aseaza intr-un loc sigur in afara echipamentelor frigorifice
 - se inregistreaza aceste pierderi in stocul de vaccin/diluent, cu precizarea seriei si tipului de vaccin/ diluant si a tipului de deteriorare
 - daca alte flacoane/fiole indemne au fost contaminate cu vaccinul varsat, se noteaza tipul, seria vaccinului, tipul de afectare si se urmeaza procedura de raportare si distrugere;

A4. Managementul vaccinului/diluantului deteriorat prin expunere la caldura (VVM – monitor de temperatura a flaconului de vaccin)

- in cazul in care culoarea VVM indica faptul ca vaccinul trebuie inlaturat sau exista incertitudini asupra modului de citire a VVM, se va proceda astfel:
 - vaccinul deteriorat se pune intr-un container de plastic sau carton
 - se eticheteaza containerul “VACCIN DETERIORAT PENTRU DISTRUGERE - NU FOLOSITI” si se depoziteaza in echipamentele frigorifice (frigider, lada frigorifica, camera frigorifica) pana cand se va obtine acordul scris al responsabilului Programului National de Vaccinare de a fi distrus;
 - se inregistreaza aceste pierderi in stocul de vaccin/diluanti, cu precizarea seriei, tipului de vaccin deteriorat si tipul de deteriorare
 - dupa ce a fost obtinut acordul de distrugere a vaccinului, containerul va fi scos din echipamentul frigorific.

A5. Managementul vaccinului/diluantului deteriorat prin congelare

- daca se suspecteaza faptul ca vaccinul a fost inghetat, trebuie efectuat testul Shake (“testul de agitare” – anexa 3 din Procedura in caz de avarie a echipamentelor frigorifice utilizate pentru depozitarea vaccinurilor);
- daca sunt descoperite fiole de vaccin inghetate, se va actiona astfel:
 - se pune vaccinul deteriorat intr-un container de plastic sau carton
 - se eticheteaza containerul “ VACCIN DEGRADAT PENTRU DISTRUGERE-NU FOLOSITI” si se depoziteaza in echipamentele frigorifice (frigider, camera frigorifica) pana cand se va obtine acordul scris al responsabilului Programului National de Vaccinare de a fi distrus
 - dupa ce a fost obtinut acordul de distrugere a vaccinului, containerul va fi scos din echipamentul frigorific
 - se inregistreaza aceste pierderi in stocul de vaccin/diluanti folosind formularul de raportare a vaccinurilor deteriorate, cu precizarea seriei, tipului de vaccin deteriorat si tipul de deteriorare

B. Procedura de distrugere a vaccinurilor si diluantilor care s-au compromis

- dupa obtinerea acordului scris al responsabilului Programului National de Vaccinare de a fi distrus se va contracta o firma specializata in distrugerea deseurilor medicale.

ANEXA I

Formular de raportare a pierderilor

Denumire cabinet/maternitate.....

Apartine de DSP.....

Completat de..... in data.....

Semnatura.....

Certificat de..... in data.....

Semnatura.....

Pierdere Deteriorat in perioada transportului Altele

Expirat Deteriorat in perioada depozitarii

Explicatii:

Nr	Data raportare eveniment	Data obtinerii acordului de distrugere	Cantitatea care va fi distrusa

Recomandari din partea Responsabilului Programului National de Vaccinare

Vor fi atasate documente doveditoare (reclamatia cabinetului/maternitatii, procesul verbal, denumire vaccine/diluant cu serie si numar, data expirare, firma de productie, etc).

